

ABC SZCZEPIEŃ na 6^{tkę}

SZCZEPHENIA SKOJARZONE
ZMNIEJSZAJĄ liczbę wktuć, a tym samym ZMNIEJSZAJĄ BÓL I STRES DZIECKA oraz rodziców 1-5



SZCZEPHENIA SKOJARZONE
DAJĄ MOŻLIWOŚĆ UODPORNENIA ORGANIZMU JEDNOCZEŚNIE PRZECIWKO KILKU CHOROBYM ZAKAŻNYM 2,4,5


SZCZEPHENIA SKOJARZONE 6 W 1 STOSOWANE SĄ W ZAPOBIEGANIU TAKIM CHOROBYM, JAK: 2,4,5



ZASTOSOWANIE SZCZEPHENIA 6 W 1

w realizacji szczepień obowiązkowych zgodnie z aktualnym PROGRAMEM SZCZEPHENIA OCHRONNYCH zmniejsza liczbę zastrzyków na pierwszej wizycie szczepiennej

3 → 1 1,4,5 #




a u dzieci do ukończenia 2. ROKU ŻYCIA#

z **14 do 5** 1,4,5



SZCZEPHENIA 6 W 1

MOGĄ BYĆ **PODAWANE JEDNOCZEŚNIE** z wieloma innymi szczepieniami pediatrycznymi (np. przeciwko rotawirusom, pneumokokom) 1,3-5 ##



SZCZEPHENIA SKOJARZONE

60% RODZICÓW

DECYDUJE SIĘ ZASZCZEPIC DZIECKO SZCZEPHENIAMI SKOJARZONYMI 6



ZAPYTAJ LEKARZA O SZCZEPHENIA na 6^{tkę}
I ODWIEDZ: www.szczepienia.pl



CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE

31

lat temu zanotowano
OSTATNI PRZYPADK
TĘŻCA
u noworodka w Polsce 7

30

OD
lat Polska
jest krajem
WOLNYM
OD POLIO 8###*

54

lata temu wprowadzono
OBOWIĄZKOWE SZCZEPHENIA
PRZECIWKO BŁONICY.
Obecnie **NIE REJESTRUJE SIĘ**
zachorowań na błonice
w Polsce 9

KRZTUSIEC

2012

W
R.
odnotowano szczególnie
WYSOKĄ LICZBĘ
ZGŁOSZONYCH ZACHOROWAŃ
NA **KRZTUSIEC** 10




2012 rok
4684
zachorowań



2013 rok
2185
zachorowań 10

WZW B***

DANE EPIDEMIOLOGICZNE WSKAZUJĄ, ŻE **SZCZEPHENIA OCHRONNE** PRZECIWKO **WZW B** PROWADZONE W **POLSCE** W RAMACH **PSO******




OD PONAD

LAT

SĄ FORMĄ PROFILAKTYKI O **WYSOKIM PROFILU SKUTECZNOŚCI** 1,12,13

Hib



ZAKAŻENIA Hib U DZIECI < 5. R.Ż. STANOWIŁY OKOŁO **1/4** PRZYPADKÓW BAKTERYJNEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH przed wprowadzeniem szczepień powszechnych przeciwko tej chorobie w Polsce 11**

Referencje: 1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 41) <http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Informacje%20dla%20rodzicow%20-%20C3%B3%9C%20C4%85och/PSO%202014.pdf> dostęp: 09.09.14; 2. Chybicka A et al. Choroby zakaźne i szczepienia ochronne. Przedruk z rozdziału z: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Kraków 2013 s.193; 3. Mazurowska-Magdzik W., Szczepionki monowalentne i poliwalentne (skojarzone). Wady i zalety ich stosowania. Przegląd Pediatryczny 2001, Vol.31, No.2, 103-106; 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Szczepionki DTap-IPV-Hib-WZW B, firmy Sanofi Pasteur, <http://www.ema.europa.eu/> dostęp na dzień 15.09.14; 5. Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki DTap-IPV-Hib-WZW B, firmy Sanofi Pasteur, <http://www.ema.europa.eu/> dostęp na dzień 15.09.14; 6. Bernatowska E., Szczepionki wysokoskojarzone - nowy plan strategiczny dla szczepień obowiązkowych w Programie Szczepień Ochronnych, Standardy Medyczne-Pediatrya 2011, 8, 895-908; 7. Jak wiele zachorowań na tężec występuje w Polsce, Portal Internetowy Szczepienia.info <http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=83&sz=259&to=> dostęp: 08.08.14; 8. Jak wiele zachorowań na poliomielitę występuje w Polsce? Portal Internetowy Szczepienia.info <http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=46&sz=148&to=> dostęp: 08.08.14; 9. Jak wiele zachorowań na błonice występuje w Polsce? Portal Internetowy Szczepienia.info <http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=87&sz=311&to=> dostęp: 08.08.14; 10. Jak wiele zachorowań na krztusiec występuje w Polsce? Portal Internetowy Szczepienia.info <http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=229&sz=229&to=> dostęp: 12.09.14; 11. Jak wiele zachorowań na zapalenie wątroby typu B w Polsce do końca 2004 roku. Przegląd Epidemiologiczny, 2006, 60, No.2, s. 185-192; 12. Magdzik W. et al. Stan zaszczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w Polsce do końca 2004 roku. Przegląd Epidemiologiczny, 2006, 60, No.2, s. 185-192; 13. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html dostęp: 17.09.14.

** Nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina).
*** Zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae typu b.
**** Wirusowe zapalenie wątroby typu B.
***** Program Szczepień Ochronnych.

Nie uwzględniono szczepień obowiązkowych osób szczególnie narażonych na zakażenie. Nie uwzględniono szczepienia przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby w pierwszej dobie życia.
Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy i nie stanowi porady lekarskiej. Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza.
Wywołany tzw. wirusem dzikim.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181 C, 02-222, Warszawa, tel. (22) 492-13-01 fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: <http://www.urpl.gov.pl/formulndi.asp>